

整形外科① インフリキシマブ療法


☆適応疾患名: 関節リウマチ

◎初回投与もしくは投与時間関連の副作用の経験がない場合に限る

薬剤	標準投与量	投与方法
インフリキシマブ	3mg/kg※	点滴静注

※最大10mg/kgまで増量可
インフリキシマブ: インフリキシマブBS点滴静注用100mg

プレメディケーション: インフリキシマブBS投与30分前に レスタミンコーワ錠 5T アセトアミノフェン 0.65g を内服
--



【推奨点滴速度】

速度 (mL/hr)	30	60	100
時間(分)	15	15	約 90

注意: 初回、2週後、6週後の投与時に投与時間関連の副作用がない場合は、「投与時間短縮インフリキシマブBSプロトコール」にしたがって投与できる。

【注意事項】

- バイタルチェックは、体温・脈拍・血圧・SaO₂をモニタリングする。
(原則、体温測定のみ開始前と終了後に行う)
- 状態観察を30分毎に行い、バイタルサイン共に異常なければ推奨速度に従って薬剤投与を行う。
- 投与速度100mL/hにアップ後、異常なければ終了して生理食塩水50mLを点滴し、抜針後にバイタルチェックと状態観察を行う。

H24.9.4 改訂
H30.10.15 改訂
R2.6.12 改訂