

消化器内科2 5-FU(動注)+インターフェロン

適応疾患名:肝細胞がん

← 1クール →

| 薬剤 | 標準投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール | | | |
|------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | 1week | 2week | 3week | 4week |
| 5-FU (5-FU) | 500mg/body | 動脈注射 | day1-7 | day8-14 | | |
| インターフェロン (IFN-) | 500万単位 | 皮下または筋肉注射 | day1, 3, 5 | day8, 10, 12 | day15, 17, 19 | day22, 24, 26 |

5-FU(フルオロウラシル):5-Fu注250協和

インターフェロン (インターフェロン):スミフェロン注DS300万単位,600万単位

イントロンA注射用300万単位,600万単位,1000万単位

| | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 5-FU | | | | | | | | | | | | | | |
| インターフェロン | | | | | | | | | | | | | | |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| | ルートキープ用 生食 100mL 使用可 |
| ↑ 24時間 持続動注 ↓ | 5-FU 500mg/body 生理食塩液 適量 |

シリンジポンプにて投与