

血液内科③ THP-COP療法

☆適応疾患名: 非ホジキンリンパ腫

				1クール		
				投与スケジュール		
薬剤		標準投与量	投与法	1week	2week	3week
エンドキサン	(CPA)	750mg/m ²	点滴	day1		
ピノルビン	(THP)	50mg/m ²	点滴	day1		
オンコビン	(VCR)	1.4mg/m ²	静注	day1		
プレドニン	(PSL)	100mg/body	内服	day1-5		

← 休薬期間 →

エンドキサン(シクロホスファミド): エンドキサン100mg, 500mg
 ピノルビン(ピラルビシン): ピノルビン10mg
 オンコビン(ビンクリスチン): オンコビン1mg
 プレドニン(プレドニゾロン): プレドニン錠5mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エンドキサン	●													
ピノルビン	●													
オンコビン	●													
プレドニン	●	●	●	●	●									

15	16	17	18	19	20	21

		本管	側管
全開	2時間	オンコビン 1.4mg/m ² 生理食塩液 50mL	
		エンドキサン 750mg/m ² 生理食塩液 500mL カイトリル 1T内服	ピノルビン 50mg/m ² 5%ブドウ糖液 100mL 30分