

整形外科3 オレンシア

☆適応疾患名: 関節リウマチ

薬剤	標準投与量		投与法
オレンシア	60kg未満	500mg	点滴静注
	60kg以上100kg以下	750mg	
	100kgを超える	1000mg	

※3回目投与までは2週間隔で投与、以後4週間隔で投与

オレンシア(アバタセプト): オレンシア点滴静注用250mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オレンシア	●													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●													
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	●													
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	●													
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
	●													

以後4週間毎に投与を継続

	本管	側管
※初回60分 2回目以降30分	生理食塩液 100mL	
		オレンシア500~1000mg 生理食塩液 100mL
		ルートキープ用 生理食塩液

※オレンシアの生食は全量を100mLに調製する。必ず添付の専用シリンジを使用して調製する。(針は通常のものを使用)

※無菌・ピロジェンフリーで蛋白結合性の低い0.2~1.2μ mのフィルターを使用

※初回の忍容性がよければ2回目以降は30分まで短縮可能