

血液内科④ R-THP-COP療法

☆適応疾患名：非ホジキンリンパ腫

			← 1クール →		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
リツキシマブ (RIT)	375mg/m ²	点滴	day1		
エンドキサン (CPA)	750mg/m ²	点滴	day2		
ピノルビン (THP)	50mg/m ²	点滴	day2		
オンコビン (VCR)	1.4mg/m ²	静注	day2		
プレドニン (PSL)	100mg/body	内服	day2-6		

← 休薬期間 →

リツキシマブ(リツキシマブ)：リツキシマブBS点滴静注100mg, 500mg「KHK」
 エンドキサン(シクロホスファミド)：エンドキサン100mg, 500mg
 ピノルビン(ピラルビシン)：ピノルビン10mg
 オンコビン(ビンクリスチン)：オンコビン1mg
 プレドニン(プレドニゾロン)：プレドニン錠5mg

プレメディケーション：リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等),
 抗ヒスタミン薬(ポララミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RIT	●													
CPA		●												
THP		●												
VCR		●												
PSL		●	●	●	●	●								

15	16	17	18	19	20	21

【1日目】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
1時間		リツキシマブ 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
1時間		(投与速度100ml/h)
最後まで		(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
 ポララミン錠 1T }

【2日目】

	本管	側管
1時間	エンドキサン 750mg/m ² 生理食塩液 500mL	ピノルビン 50mg/m ² 5%ブドウ糖液 100mL
1時間		静注 オンコビン 1.4mg/m ² 生理食塩液 20mL