

## 外科④ CAF療法

☆適応疾患名:乳がん

				1クール		
				投与スケジュール		
薬剤		標準投与量	投与法	1week	2week	3week
エンドキサン	(GPA)	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
アドリアシン	(DXR)	50mg/m <sup>2</sup>	静脈注射	day1		
フルオロウラシル	(5-FU)	500mg/m <sup>2</sup>	静脈注射	day1		

休薬期間

エンドキサン(シクロホスファミド): エンドキサン 100mg, 500mg

アドリアシン(ドキシソルビシン): アドリアシン 10mg

フルオロウラシル(フルオロウラシル): フルオロウラシル注 250mg,1000mg「トーフ」

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エンドキサン	●													
アドリアシン	●													
フルオロウラシル	●													

15	16	17	18	19	20	21

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 2V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
全開	ドキシソルビシン 50mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL
60分	エンドキサン500mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL
全開	フルオロウラシル 500mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL