

血液内科⑤ EPOCH

			← 1クール →		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
エトポシド (VP-16)	50mg/m ²	持続点滴	day1-4	/	/
ドキシソルビシン (DXR)	10mg/m ²	持続点滴	day1-4	/	/
オンコビン (VCR)	0.4mg/m ²	持続点滴	day1-4	/	/
エンドキサン (CPA)	750mg/m ²	点滴	day5	/	/
プレドニン (PSL)	60mg/m ²	内服	day1-5	/	/
			← 休薬期間 →		

エトポシド(エトポシド) : エトポシド100mg
 ドキシソルビシン(ドキシソルビシン) : ドキシソルビシン10mg, 50mg
 オンコビン(ビンクリスチン) : オンコビン1mg
 エンドキサン(シクロホスファミド) : エンドキサン100mg, 500mg
 プレドニン(プレドニゾロン) : プレドニン錠5mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エトポシド	●	●	●	●										
ドキシソルビシン	●	●	●	●										
オンコビン	●	●	●	●										
エンドキサン					●									
プレドニン	●	●	●	●	●									

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

【1～4日目】

エトポシド 50mg/m ² ドキソルビシン 10mg/m ² オンコピン 0.4mg/m ² 生理食塩液 500mL	24時間
---	------

【5日目】

エンドキサン 750mg/m ² 生理食塩液 500mL カイトリル 1T内服	2時間
--	-----