

## 外科5 CMF

☆適応疾患名:乳がん

			1クール			
			投与スケジュール			
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week	4week
エンドキサン (CPA)	100mg/m <sup>2</sup>	内服(1×1)	day1-14			
メソトレキセート (MTX)	40mg/m <sup>2</sup>	静脈注射	day1	day8		
フルオロウラシル (5-FU)	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	day8		

休薬期間

エンドキサン(シクロホスファミド): エンドキサン錠 50mg

メソトレキセート(メソトレキサート): メソトレキセート 50mg, 5mg(限定)

フルオロウラシル(フルオロウラシル): フルオロウラシル注 250mg,1000mg「トーフ」

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エンドキサン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メソトレキセート	●							●						
フルオロウラシル	●							●						

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
全開	グラニセロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
全開	メソトレキセート 40mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL
60分	フルオロウラシル 500mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 500mL

H20.12.24 改訂

H22.9.20 改訂

H25.3.4 改訂

H27.9.29 改訂