

## 血液内科⑥ EPOCH-R

			1クール		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
リツキシマブ (RIT)	375mg/m <sup>2</sup>	点滴	day1		
エトポシド (VP-16)	50mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	day1-4	/	/
ドキシソルビシン (DXR)	10mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	day1-4	/	/
オンコビン (VCR)	0.4mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	day1-4	/	/
エンドキサン (CPA)	750mg/m <sup>2</sup>	点滴	day5	/	/
プレドニン (PSL)	60mg/m <sup>2</sup>	内服	day1-5	/	/

休薬期間

リツキシマブ(リツキシマブ) : リツキシマブ100mg, 500mg  
 エトポシド(エトポシド) : エトポシド100mg  
 ドキシソルビシン(ドキシソルビシン) : ドキシソルビシン10mg, 50mg  
 オンコビン(ビンクリスチン) : オンコビン1mg  
 エンドキサン(シクロホスファミド) : エンドキサン100mg, 500mg  
 プレドニン(プレドニゾロン) : プレドニン錠5mg

プレメディケーション: リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等), 抗ヒスタミン薬(レスタミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
エトポシド	●	●	●	●										
ドキシソルビシン	●	●	●	●										
オンコビン	●	●	●	●										
エンドキサン					●									
プレドニン	●	●	●	●	●									

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

【1日目】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
1時間		リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
1時間		(投与速度100ml/h)
最後まで		(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服  
 レスタミン錠 5T

エトポシド 50mg/m <sup>2</sup> ドキソルビシン 10mg/m <sup>2</sup> オンコピン 0.4mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL	24時間
---	------

【(リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能)】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服  
 レスタミン錠 5T

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

## 【2～4日目】

エトポシド 50mg/m <sup>2</sup> ドキソルビシン 10mg/m <sup>2</sup> オンコピン 0.4mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL	24時間
---	------

## 【5日目】

エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL カイトリル 1T内服	2時間
--	-----