

泌尿器科⑥ GC

☆適応疾患名: 尿路上皮癌

薬剤	標準投与量	投与経路	1クール 投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	点滴静注	day1	day8	day15	
シスプラチン (CDDP)	70mg/m ²	点滴静注	day2			

ゲムシタビン(ゲムシタビン): ゲムシタビン 200mg, 1000mg
 シスプラチン(シスプラチン): シスプラチン 10mg, 25mg

休薬期間

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ゲムシタビン	●							●						
シスプラチン		●												

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●													

		ルートキープ用生食100mL使用可
Day1	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg100mL
Day8		デキサート注射液6.6mg
Day15	30分	ルートキープ用生食100mL
	30分	ゲムシタビン 1000mg/m² 生理食塩液 100mL

Day2	4時間以上	ソルラクト 1500mL
	2時間	生理食塩液 500mL デキサート注射液6.6mg 2V (アプレピタント併用時は1.5V)
	30分	20%マンニトール 300mL
	2時間	シスプラチン 70mg/m² 生理食塩液 1000mL
	30分	20%マンニトール 300mL
	4時間以上	ソルラクト 1500mL

グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL (側管より) 30分

【アプレピタントを服用する場合】
 Day2 のシスプラチンを始める 1 時間～1 時間半前に服用。Day3、Day4 は午前中に服用 (Day3 と Day4 は同じ時間)

H20.12.11 作成
 H21.10.14 改訂
 H23.10.31 改訂
 H25.3.4 改訂
 H28.9.21 改訂
 R1.10.24 改訂
 R3.7.30 改訂