

泌尿器科⑦ GC II (CBDCA)療法

☆適応疾患名: 尿路上皮癌

			1クール			
			投与スケジュール			
薬剤	標準投与量	投与経路	1week	2week	3week	4week
ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	点滴静注	day1	day8	day15	
カルボプラチン (CBDCA)	AUC=5	点滴静注	day2			

休薬期間

ゲムシタビン(ゲムシタビン): ゲムシタビン 200mg, 1000mg
 カルボプラチン(カルボプラチン): カルボプラチン点滴静注用150mg

<参考> CBDCA投与量(mg/body)=目標AUC値×(GFR+25) [Calvertの式]
 GFR=Ccr×体表面積/1.73

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ゲムシタビン	●							●						
カルボプラチン		●												

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●													

		ルートキープ用生食100mL使用可
Day1	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg100mL
Day8		デキサート注射液6.6mg 1V
Day15	30分	ルートキープ用生食100mL
	30分	ゲムシタビン 1000mg/m² 生理食塩液 100mL

		ルートキープ用生食100mL使用可
Day2	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg100mL
		デキサート注射液6.6mg 1V
	30分	ルートキープ用生食100mL
	3時間	カルボプラチン AUC:5 生理食塩液 1000mL

H22.12.21 作成
 H23.10.31 改訂
 R3.7.30 改訂