

## 消化器内科7 SOX+トラスツズマブ(胃がん)

☆適応疾患名: 胃がん

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
トラスツズマブ (Trastuzumab)	《初回》 8mg/kg 《2回目以降》 6mg/kg	点滴静注	day1	/	/
オキサリプラチン (L-OHP)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	/	/
エスワン (S1)	80~120mg/body	1日2回内服	day1~day14		

トラスツズマブ(トラスツズマブ): トラスツズマブBS点滴静注用60mg, 150mg  
 オキサリプラチン(オキサリプラチン): オキサリプラチン点滴静注液 50mg, 100mg  
 エスワン(テガフル, ギメラシル, オテラシルカリウム): エスワン配合OD錠 20, 25

\*投与対象: IHC法でHER2(3+),もしくはIHC法でHER2(2+),FISH法でHER2(+)  
 初回投与前は必ず心エコーを行い、心機能を評価すること

体表面積	エスワン(1日量)
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg/body
1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満	100mg/body
1.5m <sup>2</sup> 以上	120mg/body

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
トラスツズマブ	●													
オキサリプラチン	●													
エスワン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

  

	15	16	17	18	19	20	21

90分	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
全開	トラスツズマブ《初回》 8mg/kg 《2回目以降》 6mg/kg 生理食塩液 250mL
30分	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
2時間	ルートキープ用 生食 100mL
2時間	オキサリプラチン 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 500mL
	エスワンは夕食後から内服開始