

## 血液内科⑧ Hyper-CVAD

☆適応疾患名:急性リンパ性白血病

				1クール		
				投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week	
エンドキサン (CPA)	300mg/m <sup>2</sup> /回	点滴静注	day1-3			
ウロミテキサン	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3			
ドキソルビシン (DXR)	50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day4			
オンコビン (VCR)	2mg/body	静注	day4	day11		
デキサート (DEX)	33mg/body	点滴静注	day1-4	day11-14		

休薬期間

エンドキサン(シクロホスファミド):エンドキサン100mg, 500mg

ウロミテキサン(メスナ):ウロミテキサン注400mg

ドキソルビシン(ドキソルビシン):ドキソルビシン塩酸塩10mg,50mg

オンコビン(ビンクリスチン):オンコビン1mg

デキサート(デキサメタゾン):デキサート注射液6.6mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CPA	●●	●●	●●											
メスナ	●	●	●											
DXR				●										
VCR				●							●			
DEX	●	●	●	●							●	●	●	●

15	16	17	18	19	20	21

【1～3日目】

	本管	側管	
30分	デキサート注射液6.6mg 33mg/body 生理食塩液100mL	ウロミテキサン600mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL	24時間
2時間	エンドキサン300mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL カイトリル 1T内服		
2時間	エンドキサン300mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL カイトリル 1T内服		

30分	デキサート注射液6.6mg 33mg/body 生理食塩液100mL	オンコビン2mg/body 生理食塩液 50mL
24時間	ドキシソルピシン50mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL	

← 点滴

【4日目】

【11日目】

← 点滴	オンコビン2mg/body 生理食塩液 50mL
------	-----------------------------