

消化器内科8 PTX(weekly) + トラスツズマブ(胃がん)

☆適応疾患名:胃がん

← 1コース →

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
トラスツズマブ (Tmab)	《初回》 8mg/kg 《2回目以降》 6mg/kg	点滴静注	day1			day22
パクリタキセル (PTX)	80mg/m ²	点滴静注	day1	day8	day15	

5week	6week	7week	8week
		day43	
day29	day36	day43	

9week	10week	11week	12week
	day64		
day57	day64	day71	

*投与対象:IHC法でHER2(3+),もしくはIHC法でHER2(2+),FISH法でHER2(+)

初回投与前は必ず心エコーを行い、心機能を評価すること
初回投与時は入院にて行うこと
初回投与時はトラスツズマブとパクリタキセルを同日に投与しないことが望ましい

トラスツズマブ(トラスツズマブ) :トラスツズマブ60mg, 150mg

パクリタキセル : パクリタキセル注 30mg, 100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
トラスツズマブ	●													
パクリタキセル	●							●						

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
トラスツズマブ								●						
パクリタキセル	●													


	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
トラスツズマブ														
パクリタキセル	●							●						

	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
トラスツズマブ	●													
パクリタキセル	●													


	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
トラスツズマブ								●						
パクリタキセル	●							●						

	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
トラスツズマブ														
パクリタキセル	●													

【d1, 43, 64】



【d8, 15, 29, 36, 57, 71】



【d22】

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
90分	トラスツズマブ 《初回》8mg/kg 《2回目以降》6mg/kg 生理食塩液 250mL