

# 泌尿器科⑧ TIN療法

☆適応疾患名：尿路上皮癌

薬剤	標準投与量	投与経路	1クール 投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
パクリタキセル (PTX)	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1			
アクプラ (CDGP)	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1			
イホマイド (IFO)	1500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3			
ウロミテキサン (mesna)	300mg/m <sup>2</sup> /回	点滴静注	day1-3			

パクリタキセル(パクリタキセル):パクリタキセル注「NK」 30mg, 100n  
 アクプラ(ネダプラチン):アクプラ静注用 10mg, 50mg  
 イホマイド(イフォスファミド):注射用イホマイド 1g  
 ウロミテキサン(メスナ):ウロミテキサン注400mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パクリタキセル	●													
アクプラ	●													
イホマイド	●	●	●											
ウロミテキサン	●	●	●											

  

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

## 【1日目】

	主管	側管	
	ソルテム3A 2000mL(持続)		
30分		生理食塩液 100mL デキサート注射液 6.6mg 3V ガスター注射液 20mg 1A	レスタミンコーワ錠 5錠 (内服)
30分			
3時間	※メインは止める (前後フラッシュ)	パクリタキセル 175mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL	
300mL/h		ソルラクト500mL	
30分		グラニセトロン3mg	
30分		20%マンニトール 300mL	
3時間	※メインは止める (前後フラッシュ)	アクプラ 70mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL	ウロミテキサン 300mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 100mL (30分) ※イホマイド開始時 開始 3 時間後、6 時間後
4時間		イホマイド 1500mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 250mL	

【2、3日目】

	主管	側管	
	ソルデム3A(持続)		
30分		デキサート6.6mg 1V 生理食塩液 100mL	
30分			
4時間		イホマイド 1500mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 250mL	ウロミテキサン 300mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 100mL (30分) ※イホマイド開始時 開始 3 時間後、6 時間後