


泌尿器科9 BEP療法

☆適応疾患名: 精巣腫瘍



薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
ブレオ (BLM)	30mg/body	点滴静注	day2	day9	day16
ラステット (VP-16)	100mg/m ²	点滴静注	day1-5		
シスプラチン (CDDP)	20mg/m ²	点滴静注	day1-5		

ブレオ(ブレオマイシン):ブレオ注射用 5mg、30mg

ラステット(エトポシド):ラステット注 100mg

シスプラチン(シスプラチン):シスプラチン点滴静注「マルコ」10mg、50mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ブレオ		●							●					
ラステット	●	●	●	●	●									
シスプラチン	●	●	●	●	●									

15	16	17	18	19	20	21
	●					

【1、3、4、5日目】

	主管	側管
	生理食塩液 2000mL(持続)	
全開		グラニセトロン3mg 100mL デキサート注射液 6.6mg 1V
30分		
2時間		ラステット 100mg/m ² 生理食塩液 500mL
5分		
2時間		シスプラチン 20mg/m ² 生理食塩液 500mL

【2日目】

	主管	側管
	生理食塩液 2000mL(持続)	
全開		グラニセトロン3mg 100mL デキサート注射液 6.6mg 1V
30分		ブレオ 30mg/body 生理食塩液 100mL
5分		
2時間		ラステット 100mg/m ² 生理食塩液 500mL
5分		
2時間		シスプラチン 20mg/m ² 生理食塩液 500mL

【9、16日目】

	主管	側管
	生理食塩液 1000mL(持続)	
30分		サクシゾン 100mg 生理食塩液 100mL
30分		ブレオ 30mg/body 生理食塩液 100mL