

血液内科⑨ CHASER

			1クール		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
リツキシマブ (RIT)	375mg/m ²	点滴静注	day1		
エンドキサン (CPA)	1200mg/m ²	点滴静注	day2		
エトポシド (VP-16)	100mg/m ²	点滴静注	day2-4		
キロサイド (Ara-C)	2000mg/m ²	点滴静注	day3, 4		
デキサート (DEX)	33mg/body	点滴静注	day2-4		

← 休薬期間 →

リツキシマブ(リツキシマブ) : リツキシマブ100mg, 500mg
 エンドキサン(シクロホスファミド) : エンドキサン100mg, 500mg
 エトポシド(エトポシド) : エトポシド100mg
 キロサイド(シタラビン) : キロサイドN注1g(限定医薬品), キロサイド[®]20mg, 100mg(限定医薬品)
 デキサート(デキサメタゾン) : デキサート注射液6.6mg

プレメディケーション: リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等), 抗ヒスタミン薬(レスタミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
エンドキサン		●												
エトポシド		●	●	●										
キロサイド			●	●										
デキサート		●	●	●										

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

【1日目】

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 レスタミン錠 5T
1時間		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)	
1時間		(投与速度100ml/h)	
最後まで		(投与速度200ml/h)	

【1日目 (リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能)】

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 レスタミン錠 5T
30分		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)	
30分		(投与速度200mL/h)	
30分		(投与速度300mL/h)	
30分		(投与速度400mL/h)	
最後まで		(投与速度400mL/h)	

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

【2日目】

デキサート 33mg 生理食塩液 100 mL	30分
エトポシド 100mg/m ² 5%ブドウ糖液 500 mL	3時間
エンドキサン 1200mg/m ² 生理食塩液 500 mL カイトリル 1T内服	3時間

【3、4日目】

デキサート 33mg 生理食塩液 100mL	30分
エトポシド 100mg/m ² 5%ブドウ糖液 500 mL	3時間
キロサイド 2000mg/m ² 生理食塩液 500 mL	3時間