

消化器内科9 mFOLFIRINOX(膝がん)

☆適応疾患名:膝がん

← 1クール →

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール	
			1week	2week
レボホリナート (-LV)	200mg/m ²	点滴静注	day1	
フルオロウラシル (5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	day1,2	
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m ²	点滴静注	day1	
イリノテカン (CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注	day1	

← 休薬期間 →

レボホリナート(レボホリナート): レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg
 フルオロウラシル(フルオロウラシル): フルオロウラシル注 250mg, 1000mg
 オキサリプラチン(オキサリプラチン): オキサリプラチン点滴静注液50mg, 100mg
 イリノテカン(イリノテカン塩酸塩): イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg, 100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	●													
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
オキサリプラチン	●													
イリノテカン	●													

		CVポートより		
		ルートキープ用 生食 100mL 使用可		
第1日目	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg 2V		
	30分	ルートキープ用 生食 100mL		
	2時間	オキサリプラチン 85mg/m² 5%ブドウ糖注 250mL		
	2時間	1.5時間 (イリノテカン)	レボホリナート 200mg/m² 5%ブドウ糖注 250mL	
			イリノテカン 150mg/m² 5%ブドウ糖注 250mL (側管)	
第2日目	46時間	フルオロウラシル 2400mg/m² (生食で希釈) インフューザー使用 (2mL/h)		

※制吐剤はアプレピタントカプセル併用が望ましい(併用の場合、デキサートは1.5V)