

# 外科⑩ FOLFOX4法(入院限定)

☆適応疾患名:結腸直腸がん

← 1クール →

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール	
			1week	2week
レボホリナート (L-LV)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	600mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m <sup>2</sup>	ポーチ	day1,2	
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	

← 休薬期間 →

レボホリナート(レボホリナート):レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg「ヤクルト」  
 フルオロウラシル(フルオロウラシル):フルオロウラシル注 250mg,1000mg「トーフ」  
 オキサリプラチン(オキサリプラチン):オキサリプラチン 100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	●	●												
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
フルオロウラシル<ポーチ>	●	●												
オキサリプラチン	●													

		本管	
		ルートキープ用 生食 100mL 使用可	
第1日目	全開	グラニセトロン点滴静注3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V	
	30分	ルートキープ用 生食 100mL	
	2時間	レボホリナート 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖 250mL	オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖 250mL (側管)
	全開	フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
第2日目	22時間	フルオロウラシル 600mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖 500mL	
	2時間	レボホリナート 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖 250mL	
	全開	フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
	22時間	フルオロウラシル 600mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖 500mL	

H20.12.24 作成  
 H25.3.4 改訂  
 H27.6.5.改訂  
 H27.9.29 改訂