

# 泌尿器科12 GN

☆適応疾患名:尿路上皮がん

薬剤	標準投与量	投与経路	1クール 投与スケジュール		
			1week	2week	3week
ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	day8	
アクプラ (NDP)	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		

ゲムシタビン(ゲムシタビン): ゲムシタビン 200mg, 1000mg

アクプラ(ネダプラチン): アクプラ静注用10mg, 50mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ゲムシタビン	●							●						
アクプラ	●													

15	16	17	18	19	20	21

		ルートキープ用生食100mL使用可
Day1	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg 1V
	30分	ルートキープ用生食100mL
	90分	<b>ネダプラチン 80mg/m<sup>2</sup></b> 生理食塩液 500mL
	30分	<b>ゲムシタビン 1000mg/m<sup>2</sup></b> 生理食塩液 100mL
	4時間	生理食塩液 1000mL

		ルートキープ用生食100mL使用可
Day8	全開	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液100mL
	30分	ルートキープ用生食100mL
	30分	<b>ゲムシタビン 1000mg/m<sup>2</sup></b> 生理食塩液 100mL