

## 血液内科⑫ HD-MTX+Ara-C

☆適応疾患名:急性リンパ性白血病

				1クール		
				投与スケジュール		
薬剤		標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
メソトレキセート	(MTX)	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
キロサイド	(Ara-C)	2000mg/m <sup>2</sup> /回	点滴静注(1日2回)	day2-3		
ソル・メルコート	(mPSL)	40mg/body/回	点滴静注(1日2回)	day2-3		

休薬期間

メソトレキセート(メソトレキサート):メソトレキセート50mg, 200mg(限定医薬品)


キロサイド(シタラビン):キロサイドN1g(限定医薬品), キロサイド20mg, 100mg(限定医薬品)

ソル・メルコート(メチルプレドニゾロン):ソル・メドロール40mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MTX	●													
Ara-C		●●	●●											
mPSL		●●	●●											


15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

### 【1日目】




※MTX200mg/m<sup>2</sup>を1時間、残りを23時間で落とす

**【2日目】**



**【3日目】**



**【4日目】**

