


## 血液内科⑬BOR療法


### 《1～8クール目》



			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,4	day8,11	/

休薬期間

### 《9クール目以降スケジュール変更可》



			投与スケジュール				
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week	4week	5week
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	day8	day15	day22	/

休薬期間

ボルテゾミブ: ベルケイド<sup>®</sup>3mg

### 《1～8クール目》

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ボルテゾミブ	●			●				●			●			

15	16	17	18	19	20	21

### 《9クール目以降スケジュール変更可》

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ボルテゾミブ	●							●						

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
●							●						

29	30	31	32	33	34	35

	本管	側管
	生理食塩液 100mL (ルート確保)	
30分		デキサート20mg 生理食塩液 100mL
全開		ボルテゾミブ1.3mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 100mL