

消化器内科⑭ Erlotinib+GEM

☆適応疾患名:膵臓がん

				← 1クール →			
				投与スケジュール			
薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール				
タルセバ (Erlotinib)	100mg/body	内服	1week	2week	3week	4week	
ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	点滴静注	day1	day8	day15	day1~28	

タルセバ(エルロチニブ):タルセバ錠25、100

ゲムシタビン(ゲムシタビン):ゲムシタビン注 200mg, 1000mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
タルセバ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ゲムシタビン	●							●						

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
タルセバ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ゲムシタビン	●													

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
30分	ルートキープ用 生食100mL
30分	ゲムシタビン 1000mg/m² 生理食塩液 100mL
	タルセバは寝る前から開始 (食事の1時間前～食後2時間の服用は避けること)