


血液内科⑭ VMP

☆適応疾患名：多発性骨髄腫

1クール



薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール					
			1week	2week	3week	4week	5week	6week
ベルケイド	1.3mg/m ²	点滴静注 or 皮下注射	day1,4	day8,11	/	day22,25	day29,32	/
アルケラン	9mg/m ²	内服	day1-4	/	/	/	/	/
プレドニン	60mg/m ²	内服	day1-4	/	/	/	/	/

または、

ベルケイド	1.3mg/m ²	点滴静注 or 皮下注射	day1	day8	day15	day22	/
アルケラン	9mg/m ²	内服	day1-4	/	/	/	/
プレドニン	60mg/m ²	内服	day1-4	/	/	/	/

休薬期間

ボルテゾミブ(ボルテゾミブ)：ボルテゾミブ2mg,3mg

アルケラン(メルファラン)：アルケラン錠2mg

プレドニン(プレドニゾン)：プレドニン錠5mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ボルテゾミブ	●			●				●			●			
アルケラン	●	●	●	●										
プレドニン	●	●	●	●										

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
								●			●			

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	●			●										

または、

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ボルテゾミブ	●							●						
アルケラン	●	●	●	●										
プレドニン	●	●	●	●										

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●							●						

	29	30	31	32	33	34	35

	本管	側管
	生理食塩液 100mL (ルート確保)	
30分		デキサート16.5mg 生理食塩液 100mL
全開		ボルテゾミブ1.3mg/m ² 生理食塩液 100mL

ボルテゾミブ皮下注射の場合
は生理食塩液 1.5mL で
溶解して調製する。

H21.7.24 作成
H22.12.21 改訂
H23.10.31 改訂
H25.3.4 改訂