

血液内科15 COP

☆適応疾患名:非ホジキンリンパ腫


| | | | | 1クール | | |
|--------------|----------------------|------|--|----------|-------|-------|
| | | | | 投与スケジュール | | |
| 薬剤 | 標準投与量 | 投与方法 | | 1week | 2week | 3week |
| エンドキサン (CPA) | 750mg/m ² | 点滴 | | day1 | | |
| オンコビン (VCR) | 1.4mg/m ² | 静注 | | day1 | | |
| プレドニン (PSL) | 100mg/body | 内服 | | day1-5 | | |

休薬期間

エンドキサン(シクロホスファミド):エンドキサン100mg, 500mg
 オンコビン(ビンクリスチン):オンコビン1mg
 プレドニン(プレドニゾロン):プレドニン錠5mg

| | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| CPA | ● | | | | | | | | | | | | | |
| VCR | ● | | | | | | | | | | | | | |
| PSL | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |



H22.4.6 作成
 H25.3.4 改訂
 H27.4.1 改訂
 H29.9.4 改訂