

外科⑮ FOLFIRI療法

☆適応疾患名: 結腸直腸がん

1クール

投与スケジュール

薬剤	標準投与量	投与経路	1week	2week	3week
レボホリナート (I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	day1		
フルオロウラシル (5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	day1,2		
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m ²	静注(全開)	day1		
イリノテカン (CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注	day1		

休薬期間

レボホリナート(レボホリナート):レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg
 フルオロウラシル(フルオロウラシル):フルオロウラシル注 250mg ,1000mg
 イリノテカン(イリノテカン塩酸塩):イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg, 100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	●													
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
フルオロウラシル<全開>	●													
イリノテカン	●													

		CVポートより	
第1日目	全開	ルートキープ用 生食 100mL 使用可	
	30分	グラニセトロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg 1V	
	2時間 1.5時間 (イリノテカン)	ルートキープ用 生食 100mL	イリノテカン 150mg/m ² 5%ブドウ糖注 250mL (側管)
	全開	フルオロウラシル 400mg/m ² 生理食塩液 50mL	
第2日目	46時間	フルオロウラシル 2400mg/m ² (生食で希釈) インフューザー使用 (2mL/h)	

H21.11.4 改訂
 H26.9.10 改訂
 H27.9.29 改訂