

# 泌尿器科16 M-VAC II (CBDCA)療法

☆適応疾患名:尿路上皮がん  
1クール

薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
メソトレキセート (MTX)	30mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		day15	day22
エクザール (VBL)	3mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day2		day15	day22
ドキソルビシン (DXR)	30mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day2			
カルボプラチン (CBDCA)	AUC=5	点滴静注	day2			

メソトレキセート(メトトレキサート):メソトレキセート5mg, 50mg  
 エクザール(ビンブラスチン):エクザール10mg [限定薬品]  
 ドキソルビシン(ドキソルビシン):ドキソルビシン10mg, 50mg  
 カルボプラチン(カルボプラチン):カルボプラチン150mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
メソトレキセート	●													
エクザール		●												
ドキソルビシン		●												
カルボプラチン		●												

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
●							●						
●							●						

Day1	全開	ルートキープ用生食100mL使用可 グラニセトロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg
	30分	ルートキープ用生食100mL
	全開	メソトレキセート 30mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL

		ルートキープ用生食100mL使用可
Day2	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg 1V
	30分	ルートキープ用生食100mL
	全開	エクザール 3mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL
	全開	ドキシソルビシン30mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL
	3時間	カルボプラチン AUC:5 生理食塩液 1000mL

		ルートキープ用生食100mL使用可
Day15 Day22	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg
	30分	ルートキープ用生食100mL
	全開	メソトレキセート 30mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL
	全開	エクザール 3mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL