

消化器内科16 TAS-102+BV

☆適応疾患名: 結腸直腸がん

			1クール			
			投与スケジュール			
薬剤	標準投与量	投与経路	1week	2week	3week	4week
ベバシズマブ (Bevacizumab)	5mg/kg	点滴静注	day1		day15	
ロンサーフ配合錠 (TAS-102)	70mg/m ²	内服	day1~day5	day8~day12	休薬期間	

ベバシズマブ(ベバシズマブ): ベバシズマブBS点滴静注100mg, 400mg
 TAS-102(トルフルリジン, チピラシル): ロンサーフ配合錠 T15, T20


ロンサーフ投与量(トリフルリジン相当量)

体表面積	投与量(1日量)
1.07m ² 未満	70mg
1.07m ² 以上1.23m ² 未満	80mg
1.23m ² 以上1.38m ² 未満	90mg
1.38m ² 以上1.53m ² 未満	100mg
1.53m ² 以上1.69m ² 未満	110mg
1.69m ² 以上1.84m ² 未満	120mg
1.84m ² 以上1.99m ² 未満	130mg
1.99m ² 以上2.15m ² 未満	140mg
2.15m ² 以上	150mg

※分2 朝夕食後で投与する
 day1,8の夕食後から内服開始

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	●													
ロンサーフ	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●													



参考文献

- ・ P Pfeiffer et al. TAS-102 with or without bevacizumab in patients with chemorefractory metastatic colorectal cancer: an investigator-initiated, open-label, randomized, phase 2 trial Lancet Oncol. 21(3), 412-420 (2020).