


泌尿器科⑰ ddM-VAC療法

☆適応疾患名:尿路上皮癌



薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール	
			1week	2week
メソトレキセート (MTX)	30mg/m ²	点滴静注	day1	
エクザール (VBL)	3mg/m ²	点滴静注	day2	
ドキソルビシン (DXR)	30mg/m ²	点滴静注	day2	
シスプラチン (CDDP)	70mg/m ²	点滴静注	day2	


メソトレキセート(メソトレキサート):メソトレキセート5mg, 50mg
 エクザール(ビンブラスチン):エクザール10mg [限定薬品]
 ドキソルビシン(ドキソルビシン):ドキソルビシン10mg, 50mg
 シスプラチン(シスプラチン):シスプラチン10mg, 50mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
メソトレキセート	●													
エクザール		●												
ドキソルビシン		●												
シスプラチン		●												

Day1	全開	ルートキープ用生食100mL使用可 グラニセトロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg
	30分	ルートキープ用生食100mL
	全開	メソトレキセート 30mg/m ² 生理食塩液 50mL

Day2	4時間	生理食塩液 1000mL
	2時間	生理食塩液 500mL デキサート注射液6.6mg 2V (アプレピタント併用時は 1.5V)
	2時間	生理食塩液 500mL
	30分	20%マンニトール 300mL
	2時間	シスプラチン 70mg/m ² 生理食塩液 1000mL
	30分	20%マンニトール 300mL
	4時間以上	ソルラクト 1500mL

側管



【アプレピタントを服用する場合】
 Day2 のシスプラチンを始める 1 時間～
 1 時間半前に服用。Day3、Day4 は午前中
 に服用 (Day3 と Day4 は同じ時間)

Day3	ジーラスタ皮下注3.6mg (シスプラチン投与終了24時間以降)
------	-------------------------------------