

泌尿器科⑱ ddGC

☆適応疾患名:尿路上皮癌

			1コース	
			投与スケジュール	
薬剤	標準投与量	投与経路	1week	2week
ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	点滴静注	day1	休薬期間
シスプラチン (CDDP)	70mg/m ²	点滴静注	day1	

ゲムシタビン(ゲムシタビン): ゲムシタビン 200mg, 1000mg
 シスプラチン(シスプラチン): シスプラチン 10mg, 25mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
シスプラチン	●													
ゲムシタビン	●													

4時間以上	ソルラクト 1500mL	
2時間	生理食塩液 500mL デキサート注射液6.6mg 2V (アプレピタント併用時は1.5V)	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL (側管より)
30分	ルートキープ用生食100mL	
30分	ゲムシタビン 1000mg/m² 生理食塩液 100mL	
30分	20%マンニトール 300mL	
2時間	シスプラチン 70mg/m² 生理食塩液 1000mL	【アプレピタントを服用する場合】 シスプラチンを始める1時間~1時間半前に服用。
30分	20%マンニトール 300mL	
4時間以上	ソルラクト 1500mL	
Day2	ジーラスタ皮下注3.6mg (シスプラチン投与終了24時間以降)	