

外科⑱ F E C

☆適応疾患名：乳がん

← 1クール →

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
エンドキサン (CPA)	500mg/m ²	点滴静注	day1		
塩酸エピルビシン (EPI)	60mg/m ²	静脈注射	day1		
フルオロウラシル (5-FU)	500mg/m ²	静脈注射	day1		

← 休薬期間 →

エンドキサン(シクロホスファミド)：注射用エンドキサン100mg, 50(休薬期間
 塩酸エピルビシン(エピルビシン)：塩酸エピルビシン注 10mg
 フルオロウラシル(フルオロウラシル)：フルオロウラシル注 250mg,1000mg「トーワ」

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エンドキサン	●													
塩酸エピルビシン	●													
フルオロウラシル	●													

15	16	17	18	19	20	21

	ルートキープ用生食100mL使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 2V
30分	ルートキープ用生食100mL
全開	塩酸エピルビシン 60mg/m ² 生理食塩液 50mL
60分	エンドキサン500mg/m ² 生理食塩液 500mL
全開	フルオロウラシル 500mg/m ² 生理食塩液 50mL

H20.12.24 改訂
 H22.9.20 改訂
 H23.10.31 改訂
 H25.3.4 改訂
 H27.9.29 改訂