

外科22 mFOLFOX6+BV療法

☆適応疾患名:結腸直腸がん

薬剤	標準投与量	投与経路	1クール	
			投与スケジュール	
			1week	2week
ベバシズマブ (BV)	5mg or 10mg/kg	点滴静注	day1	
レボホリナート (-LV)	200mg/m ²	点滴静注	day1	
フルオロウラシル (5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m ²	静注(全開)	day1	
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m ²	点滴静注	day1	

← 休薬期間 →

ベバシズマブ(ベバシズマブ):ベバシズマブBS点滴静注100mg, 400mg
 レボホリナート(レボホリナート):レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg
 フルオロウラシル(フルオロウラシル):フルオロウラシル注 250mg,1000mg
 オキサリプラチン(オキサリプラチン):オキサリプラチン点滴静注液50mg, 100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	●													
レボホリナート	●													
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
フルオロウラシル<全開>	●													
オキサリプラチン	●													

		CVポートより
第1日目		ルートキープ用 生食 100mL
	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
	90分※	ベバシズマブ5mg or 10mg/kg 生理食塩液 100mL
	5分	ルートキープ用 生食100mL
	2時間	レボホリナート 200mg/m ² 5%ブドウ糖注 250mL
	全開	フルオロウラシル 400mg/m ² 生理食塩液 50mL
第2日目	46時間	フルオロウラシル 2400mg/m ² (生食で希釈) インフューザーポンプ使用 (2mL/h)

※ ベバシズマブの投与時間は
初回は必ず 90 分、
以後認容性が良好であれば
60 分、30 分と短縮できる。

オキサリプラチン85mg/m²
5%ブドウ糖注 250mL
(側管)

H21.7.24 作成
 H22.1.13 改訂
 H25.3.4 改訂
 H27.6.5 改訂
 H27.9.29 改訂