



## 血液内科25 R-B療法

☆適応疾患名: 非ホジキンリンパ腫



リツキシマブ (リツキシマブ): リツキシマブ100mg, 500mg  
 ベンダムスチン (ベンダムスチン): ベンダムスチン25mg, 100mg

プレメディケーション: リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等), 抗ヒスタミン薬(レスタミン等)を内服

※低悪性度非ホジキンリンパ腫の場合は90mg/m<sup>2</sup>, 4週間毎

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
ベンダムスチン		●	●											

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
ベンダムスチン	●	●												

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

H22.12.21 作成  
 H25.9.13 改訂  
 R4.7.6 改訂  
 R4.7.13 改訂

## 【1日目】

本管	側管
生理食塩液 100mL	
	リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
	(投与速度100ml/h)
	(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服  
 レスタミン 5T }

## 【1日目 (リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能)】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服  
 レスタミン 5T }

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

## 【2日目・3日目】

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
10分	ベンダムスチン 120mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL

※調製後室温では6時間、2-8℃保存の場合24時間以内に投与を終了すること

H22.12.21 作成  
H25.9.13 改訂  
R4.7.6 改訂  
R4.7.13 改訂

<外来では下記に変更可能>

【1日目】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)
全開		グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
10分		ベンダムスチン 120mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL

ロキソプロフェン錠 1T } 内服  
 ンレスタミン 5T

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

【2日目】

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
10分	ベンダムスチン 120mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL

※調製後室温では6時間、2-8℃保存の場合24時間以内に投与を終了すること

H22.12.21 作成  
 H25.9.13 改訂  
 R4.7.6 改訂  
 R4.7.13 改訂