

## 血液内科27 R-FC療法

				1クール			
				投与スケジュール			
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week	4week	
リツキサン (RIT)	375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	/	/	/	
エンドキサン (CPA)	250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day2-4	/	/	/	
フルダラ (Fludarabine)	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day2-4	/	/	/	
				休薬期間			

リツキサン(リツキシマブ) : リツキサン100mg, 500mg  
 エンドキサン(シクロホスファミド) : エンドキサン100mg, 500mg  
 フルダラ(フルダラビン) : フルダラ50mg

プレメディケーション: リツキサン投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等),  
 抗ヒスタミン薬(ポララミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキサン	●													
エンドキサン		●	●	●										
フルダラ		●	●	●										

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

【1日目】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
1時間		リツキサンの375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
1時間		(投与速度100ml/h)
最後まで		(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1錠 } 内服  
 ポララミン錠 1T }

【1日目（リツキサン2回目以降は下記に変更可能）】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		リツキサンの375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)

ロキソプロフェン錠 1錠 } 内服  
 ポララミン錠 1T }

※リツキサン初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

**【2～4日目】**

フルダラ 25mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液100mL	↑ 1時間 ↓
エンドキサン 250mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液500mL	↑ 2時間 ↓