

外科28 XELOX

☆適応疾患名: 結腸直腸がん

			1クール		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与経路	1week	2week	3week
オキサリプラチン (L-OHP)	130mg/m ²	点滴静注	day1	/	/
カペシタビン (Cap)	1200~2100mg/回	内服	day1~day14		

↔ 休薬期間

オキサリプラチン(オキサリプラチン): オキサリプラチン点滴静注液50mg, 100mg
 カペシタビン(カペシタビン): カペシタビン錠 300mg

カペシタビン投与量

体表面積	投与量(1日量)
1.36m ² 未満	2400mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	3000mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	3600mg
1.96m ² 以上	4200mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン	●													
カペシタビン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

15	16	17	18	19	20	21

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液 6.6mg 1V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
2時間	オキサリプラチン 130mg/m ² 5%ブドウ糖注 500mL
	カペシタビンは夕食後から内服開始

H21.11.10 作成
 H25.3.4 改訂
 H26.6.6 改訂
 H27.6.5 改訂
 H27.10.14 改訂