

## 外科29 XELOX+BV

☆適応疾患名:結腸直腸がん

薬剤	標準投与量	投与経路	1クール		
			投与スケジュール		
			1week	2week	3week
アバスチン (BV)	7.5mg/kg	点滴静注	day1	/	/
オキサリプラチン (L-OHP)	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	/	/
ゼローダ (Cap)	1200~2100mg/回	内服	day1~day14		

↔ 休薬期間

アバスチン(ベバシズマブ):アバスチン点滴静注用100mg, 400mg

オキサリプラチン(オキサリプラチン):オキサリプラチン点滴静注液50mg,100mg「ホスピーラ」

ゼローダ(カペシタビン):ゼローダ錠 300mg

体表面積	投与量(1日量)
1.36m <sup>2</sup> 未満	2400mg
1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満	3000mg
1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満	3600mg
1.96m <sup>2</sup> 以上	4200mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アバスチン	●													
オキサリプラチン	●													
ゼローダ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

  

15	16	17	18	19	20	21

	ルートキープ用 生食 100mL
↑ 全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
↑ 90分※	<b>アバスチン 7.5mg/kg</b> 生理食塩液 100mL (点滴静注)
↑ 5分	ルートキープ用 生食 100mL
↑ 2時間	<b>オキサリプラチン 130mg/m<sup>2</sup></b> 5%ブドウ糖注 500mL
	ゼローダは夕食後から内服開始

H21.11.10 作成  
H25.3.4 改訂  
H26.6.6 改訂  
H27.6.5 改訂