

血液内科30 ビダーザ

☆適応疾患名: 骨髄異形成症候群(MDS)

← 1クール →

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ビダーザ (5-AzaC)	75mg/m ²	皮下注射、または点滴静注	day1-7			

※day1-5 day8-9としても良い

ビダーザ(アザシチジン):ビダーザ注射用100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビダーザ	●	●	●	●	●	●	●							

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28


または、

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビダーザ	●	●	●	●	●			●	●					

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

【皮下注射】


ビダーザ 75mg/m²
注射用水(1Vにつき 4mL)



※調製後 1 時間以内に投与を終了すること

注) 調整方法のパンフレットには投与液量が 4mL を超える場合は 2 本の注射筒に 2 等分し 2 箇所注射とある
⇒ 1 本のシリンジに充填、1 箇所注射としてもよい(H30.4.5 確認済)

【点滴静注】



※調製後1時間以内に投与を終了すること

【参考】

制吐剤は 5-HT₃ 受容体拮抗薬(カイトリルまたはグラニセトロン)を推奨

H24.9.4 作成
H30.4.17 改訂
R3.7.30 改訂