

血液内科31 ABVD

☆適応疾患名:ホジキンリンパ腫

← 1クール →

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ドキソルビシン (DXR)	25mg/m ²	点滴静注	day1	/	day15	/
ブレオ (BLM)	10mg/m ²	点滴静注	day1	/	day15	/
エクザール (VLB)	6mg/m ²	静注	day1	/	day15	/
ダカルバジン (DTIC)	375mg/m ²	点滴静注	day1	/	day15	/

← 休薬期間 →
← 休薬期間 →

ドキソルビシン(ドキソルビシン):ドキソルビシン10mg, 50mg
 ブレオ(ブレオマイシン):ブレオ注射用5mg, 30mg
 エクザール(ビンブラスチン):エクザール注射用10mg
 ダカルバジン(ダカルバジン):ダカルバジン注用100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ドキソルビシン	●													
ブレオ	●													
エクザール	●													
ダカルバジン	●													

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
●													
●													
●													
●													

↑ 静注	エクザール 6mg/m² 生理食塩液20mL
↑ 静注	サクシゾン100mg 生理食塩液20mL
↑ 30分	ドキソルビシン 25mg/m² 5%ブドウ糖液100mL
↑ 15分	ブレオ 10mg/m² 生理食塩液100mL
↑ 1時間	ダカルバジン 375mg/m² 生理食塩液100mL