

血液内科32 VCD

☆適応疾患名: 多発性骨髄腫

1クール



薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
ベルケイド	1.3mg/m ²	点滴静注 or 皮下注射	day1,4	day8,11	
エンドキサン	500mg/m ²	点滴静注 or 内服	day1	day8	(day15)
デキサート	33mg/body	点滴静注	day1	day8	day15

または、

ベルケイド	1.3mg/m ²	点滴静注 or 皮下注射	day1	day8	day15	day22
エンドキサン	300mg/m ²	点滴静注 or 内服	day1	day8	day15	day22
デキサート	33mg/body	点滴静注	day1-4	day9-12	day17-20	

ベルケイド(ボルテゾミブ): ベルケイド3mg

エンドキサン(シクロフォスファミド): 注射用エンドキサン100mg, 500mg エンドキサン錠50mg

デキサート(デキサメタゾン): デキサート注射液6.6mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベルケイド	●			●				●			●			
エンドキサン	●							●						
デキサート	●							●						

	15	16	17	18	19	20	21
(●)							
●							

または、

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベルケイド	●							●						
エンドキサン	●							●						
デキサート	●	●	●	●					●	●	●	●		

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
●								●						
●								●						
		●	●	●	●									

	本管	側管
	生理食塩液 100mL (ルート確保)	
30分		デキサート33mg 生理食塩液 100mL
全開		ベルケイド1.3mg/m ² 生理食塩液 100mL
2時間		エンドキサン300 or 500mg/m ² 生理食塩液 500mL

ベルケイド皮下注射の場合
は生理食塩液 1.5mL で溶
解して調製する。

H25.9.13 作成