

# 外科32 IRIS

☆適応疾患名: 結腸直腸がん

		1クール				
		投与スケジュール				
薬剤	標準投与量	投与経路	1week	2week	3week	4week
イリノテカン (CPT-11)	125mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		day15	
エスワン (S1)	80~120mg/body	内服	day1~day7	day8~day14		

← 休薬期間 →

イリノテカン(イリノテカン): イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg, 100mg  
 エスワン(テガフル, ギメラシル, オテラシルカリウム): エスワンOD錠T 20, 25

## S1投与量

体表面積	投与量(1日分)
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg
1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満	100mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イリノテカン	●													
エスワン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

  

	15	16	17	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●													

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
90分	イリノテカン 125mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL
	エスワンは夕食後から内服開始

H22.4.6 作成  
 H25.4.1 改訂  
 H29.9.27 改訂