

血液内科33 SMILE

☆適応疾患名: 非ホジキンリンパ腫

← 1クール →

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
メソトレキセート (MTX)	2000mg/m ²	点滴	day1	/	/	/
イホマイド (IFO)	1500mg/m ²	点滴	day2-4	/	/	/
ラステット (VP-16)	100mg/m ²	点滴	day2-4	/	/	/
デキサート (DEXA)	33mg/body	点滴	day2-4	/	/	/
ロイナーゼ (L-ASP)	6000U/m ²	点滴	/	day8, 10, 12, 14, 16, 18, 20		/

← 休薬期間 →

メソトレキセート(メソトレキサート):メソトレキセート50mg, 200mg(限定医薬品)
 イホマイド(イホスファミド):イホマイド1g
 ラステット(エトポシド):ラステット100mg
 デキサート(デキサメタゾン):デキサート6.6mg
 ロイナーゼ(アスパラギナーゼ):ロイナーゼ5000U

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
メソトレキセート	●													
イホマイド		●	●	●										
ラステット		●	●	●										
デキサート		●	●	●										
ロイナーゼ								●		●		●		●

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		●		●		●								

【1日目】

全開	グラニセトン点滴静注液3mg 100mL (必須ではない)
6時間	メソトレキセート2000mg/m ² 生理食塩液 500mL

【2~4日目】

グラニセトン点滴静注液3mg	30分	
デキサート 33mg 生理食塩液100mL	30分	
ラステット 100mg/m ² 5%ブドウ糖液500mL	2時間	
ウロミテキサン 300mg/m ² 生理食塩液100mL	30分	
イホマイド 1500mg/m ² 生理食塩液500mL	6時間	
ウロミテキサン 300mg/m ² 生理食塩液100mL	30分	※イホマイド開始4時間後
ウロミテキサン 300mg/m ² 生理食塩液100mL	30分	※イホマイド開始8時間後

ロイコボリン15mg × 4

静注(6時間毎)
※メソトレキセート終了24時間後から開始

【8、10、12、14、16、18、20日目】

	本管	側管
	生理食塩液 100mL	
1時間		ロイナーゼ6000U/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
1時間		(投与速度100ml/h)
最後まで		(投与速度200ml/h)

ポララミン注5mg 1A

サクシゾン100mg 1V
生食20mL

☆皮内反応試験[ショックがあらわれるおそれがあるので、ロイナーゼ投与に先立って実施することが望ましい。]

※初回のみでよい(長期間空いた場合は再度行う)

本剤5000K.U.を日局注射用水2mLで溶解後、日局生理食塩液にて全量5mLとする。このうち0.1mLを注射筒で分取し、日局生理食塩液で全量1mLとした後、この0.1mLを皮内注射する(投与量:10K.U.)。皮内注射後15~30分間異常がないことを確認する。