

# 外科35 FOLFOX4+アービタックス(入院限定)

☆適応疾患名: 結腸直腸がん

← 1クール →

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール	
			1week	2week
アービタックス (C-mab)	《初回》400mg/m <sup>2</sup> 《2回目以降》250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	day8
レボホリナート (/-LV)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	600mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m <sup>2</sup>	ボース	day1,2	
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	

休薬期間

アービタックス(セツキシマブ): アービタックス100mg  
 レボホリナート(レボホリナート): レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg「ヤクルト」  
 フルオロウラシル(フルオロウラシル): フルオロウラシル注 250mg, 1000mg「トーフ」  
 オキサリプラチン(オキサリプラチン): オキサリプラチン点滴静注液50mg, 100mg「ホスピーラ」

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アービタックス	●							●						
レボホリナート	●	●												
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
フルオロウラシル<ボース>	●	●												
オキサリプラチン	●													

## 【1日目(初回のみ)】

		本管	
第1日目	全開	ルートキープ用 生食 100mL 使用可 グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V	← レスタミンコーワ錠 5錠(内服)
	30分	ルートキープ用 生食 100mL	
	2時間	アービタックス 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 250mL	
	1時間	生理食塩液 100mL	
	2時間	レボホリナート 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL	オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL (側管)
	全開	フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
	22時間	フルオロウラシル 600mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 500mL	
第2日目	2時間	レボホリナート 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL	
	全開	フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
	22時間	フルオロウラシル 600mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 500mL	

【1日目(初回以外)】

		本管	
		ルートキープ用 生食 100mL 使用可	
第1日目	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V	← レスタミンコーワ錠 5錠(内服)
	30分	ルートキープ用 生食 100mL	
	1時間	アービタックス 250mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 250mL	
	1時間	生理食塩液 100mL	
	2時間	レボホリナート 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL	オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL (側管)
	全開	フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
	22時間	フルオロウラシル 600mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 500mL	
第2日目	2時間	レボホリナート 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL	
	全開	フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
	22時間	フルオロウラシル 600mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 500mL	

【8日目】

	生理食塩液 100mL (ルートキープ)	← レスタミンコーワ錠 5錠(内服) デキサート注射液 6.6mg 1V(静注)
30分		
1時間	アービタックス 100mg 250mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 250mL	
1時間	生理食塩液 100mL	