

血液内科35 R-GDP

☆適応疾患名：非ホジキンリンパ腫

				← 1クール →		
				投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法		1week	2week	3week
リツキシマブ (RIT)	375mg/m ²	点滴静注	day1	/	/	/
ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	点滴静注	day2	/	day9	/
シスプラチン (CDDP)	75mg/m ²	点滴静注	day2	/	/	/
デキサート (DEXA)	33mg/body	点滴静注	day2-5	/	/	/

↔ 休薬期間

リツキシマブ(リツキシマブ)：リツキシマブBS点滴静注100mg, 500mg
 ゲムシタビン(ゲムシタビン)：ゲムシタビン200mg, 1000mg
 シスプラチン(シスプラチン)：シスプラチン10mg, 50mg
 デキサート(デキサメタゾン)：デキサート6.6mg

プレメディケーション：リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等),
 抗ヒスタミン薬(ポラミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
ゲムシタビン		●							●					
シスプラチン		●												
デキサート		●	●	●	●									

15	16	17	18	19	20	21

【1日目】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
1時間		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
1時間		(投与速度100ml/h)
最後まで		(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
 ポララミン錠 1T }

【1日目 (リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能)】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
 ポララミン錠 1T }

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

【2日目】

4時間 以上	ソルラクト 1500mL
30分	生理食塩液 100mL デキサート注射液 6.6mg 5V
30分	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL
30分	ゲムシタビン 1000mg/m² 生理食塩液 100mL
30分	20%マンニトール 300mL
2時間	シスプラチン 75mg/m² 生理食塩液 1000mL
30分	20%マンニトール 300mL
1時間	生理食塩液 250mL 硫酸Mg補正液1mEq/mL 10mL
4時間 以上	ソルラクト 1500mL

【9日目】

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
30分	ルートキープ用 生食100mL
30分	ゲムシタビン 1000mg/m² 生理食塩液 100mL