

# 外科36 mFOLFOX6+アービタックス

☆適応疾患名: 結腸直腸がん

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール	
			1week	2week
アービタックス (C-mab)	《初回》400mg/m <sup>2</sup> 《2回目以降》250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	day8
レボホリナート (L-LV)	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
フルオロウラシル (5-FU)	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m <sup>2</sup>	静注(全開)	day1	
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	

1クール  
休薬期間

アービタックス(セツキシマブ): アービタックス100mg  
 レボホリナート(レボホリナート): レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg「ヤクルト」  
 フルオロウラシル(フルオロウラシル): フルオロウラシル注 250mg, 1000mg「トーワ」  
 オキサリプラチン(オキサリプラチン): オキサリプラチン点滴静注液50mg, 100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アービタックス	●							●						
レボホリナート	●													
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
フルオロウラシル<全開>	●													
オキサリプラチン	●													

## 【1日目(初回のみ)】

		CVポートより	
第1日目		ルートキープ用 生食 100mL 使用可	
	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V	← レスタミンコーワ錠 5錠(内服)
	30分	ルートキープ用 生食 100mL	
	2時間	アービタックス 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 250mL	
	1時間	生理食塩液 100mL	
	2時間	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL	オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL (側管)
	全開	フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
第2日目	46時間	フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> (生食で希釈) インフューザーポンプ使用 (2mL/h)	

【1日目(初回以外)】

		CVポートより	
		ルートキープ用 生食 100mL 使用可	
第1日目	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V	← レスタミンコーワ錠 5錠(内服)
	30分	ルートキープ用 生食 100mL	
	1時間	アービタックス 250mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 250mL	
	1時間	生理食塩液 100mL	
	2時間	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL	オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL (側管)
	全開	フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
	第2日目	46時間	フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> (生食で希釈) インフューザーポンプ使用 (2mL/h)

【8日目】

	生理食塩液 100mL(ルートキープ)	← レスタミンコーワ錠 5錠(内服) デキサート注射液6.6mg 1V(静注)
30分		
1時間	アービタックス100mg 250mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 250mL	
1時間	生理食塩液100mL	