

# Ⅱ液内科37 ファリーダック+ボルテゾミブ+デキサメタゾン

☆適応疾患名: 多発性骨髄腫

← 1クール →

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注射	day1,4	day8,11	
ファリーダック	20mg/body	内服	day1,3,5	day8,10,12	
レナデックス	20mg/body	内服	day1,2,4,5	day8,9,11,12	

または、

ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注射	day1	day8	
ファリーダック	20mg/body	内服	day1,3,5	day8,10,12	
レナデックス	20mg/body	内服	day1,2	day8,9	


← 休薬期間 →

ボルテゾミブ(ボルテゾミブ): ボルテゾミブ3mg  
 ファリーダック(パノビノスタット): ファリーダック錠10mg, 15mg  
 レナデックス(デキサメタゾン): レナデックス錠4mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ボルテゾミブ	●			●				●			●			
ファリーダック	●		●		●			●		●		●		
レナデックス	●	●		●	●			●	●		●	●		
	15	16	17	18	19	20	21							

または、

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ボルテゾミブ	●							●						
ファリーダック	●		●		●			●		●		●		
レナデックス	●	●						●	●					
	15	16	17	18	19	20	21							



※ボルテゾミブ 2mg は生理食塩液 1mL、  
 ボルテゾミブ 3mg は生理食塩液 1.5mL で溶解し必要量を抜き取る