

血液内科38 DRC

☆適応疾患名:原発性マクログロブリン血症
非ホジキンリンパ腫

← 1コース →

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
リツキシマブ (RIT)	375mg/m ²	点滴静注	day1		
デキサート (DEX)	20mg/body	点滴静注	day1		
エンドキサン (CPA)	200mg/m ² /day	内服2×1	day1-5		

← 休薬期間 →

リツキシマブ(リツキシマブ):リツキシマブ100mg, 500mg
 デキサート(デキサメタゾン):デキサート6.6mg
 エンドキサン(シクロホスファミド):エンドキサン錠50mg

プレメディケーション:リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等),
抗ヒスタミン薬(レスタミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
デキサート	●													
エンドキサン	●	●	●	●	●									

15	16	17	18	19	20	21

【1日目リツキシマブ初回】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	デキサート 20mg 生理食塩液100mL
1時間		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
1時間		(投与速度100ml/h)
最後まで		(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T
 レスタミン錠 5T } 内服

【1日目（リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能）】

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	デキサート 20mg 生理食塩液100mL
30分		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)

ロキソプロフェン錠 1T
 レスタミン錠 5T } 内服