


外科38 IRIS+BV

☆適応疾患名:結腸直腸がん




薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ベバシズマブ (Bevacizumab)	5mg/kg	点滴静注	day1		day15	
イリノテカン (CPT-11)	100mg/m ²	点滴静注	day1		day15	
エスワン (S1)	80~120mg/body	内服	day1~day7	day8~day14		

← 休薬期間 →

ベバシズマブ(ベバシズマブ):ベバシズマブBS点滴静注100mg, 400mg
 イリノテカン(イリノテカン):イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg, 100mg
 エスワン(テガフル, ギメラシル, オテラシルカリウム):エスワンOD錠T 20, 25

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	●													
イリノテカン	●													
エスワン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	15	16	17	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●													
	●													



※ ベバシズマブの投与時間は初回は必ず90分、以後忍容性が良好であれば60分、30分と短縮できる。

ベバシズマブと同じ速度で5分間生食を流す(残があっても良い)