

血液内科39 KRd

☆適応疾患名：多発性骨髄腫

1コース



【1コース目】

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
カイプロリス	20mg/m ²	点滴静注	day1, 2			
	27mg/m ²	点滴静注		day8, 9	day15, 16	
レブラミド	25mg/body	内服	day1-21			
レナデックス	40mg/body	内服	day1	day8	day15	day22

【2～12コース目】

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
カイプロリス	27mg/m ²	点滴静注	day1, 2	day8, 9	day15, 16	
レブラミド	25mg/body	内服	day1-21			
レナデックス	40mg/body	内服	day1	day8	day15	day22

【13コース目以降】

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
カイプロリス	27mg/m ²	点滴静注	day1, 2		day15, 16	
レブラミド	25mg/body	内服	day1-21			
レナデックス	40mg/body	内服	day1	day8	day15	day22

カイプロリス(カルフィルゾミブ)：カイプロリス点滴静注用10mg, 40mg

【血管外漏出時の組織侵襲：炎症性薬剤】

レブラミド(レナリドミド)：レブラミドカプセル5mg

レナデックス(デキサメタゾン)：レナデックス錠4mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
カイプロリス	●	●						●※	●※					
レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
レナデックス	●							●						

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●							
	●							●						

※13コース目以降はカイプロリスの day8,9 を省略

	本管	側管
	5%ブドウ糖液100mL (ルート確保)	
↑ 10分 ↓		カiproリス 27mg/m ² (第1コースday1, 2のみ20mg/m ²) 5%ブドウ糖液 50mL

注)カiproリスの溶解は5%ブドウ糖液または注射用水を使用する

Cl⁻イオンを含む輸液との配合不可