

# 外科40 FOLFOX4+ベクティビックス(入院限定)

☆適応疾患名: 結腸直腸がん

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール	
			1week	2week
ベクティビックス (P-mab)	6mg/kg	点滴静注	day1	
レボホリナート (-LV)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	600mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m <sup>2</sup>	ポーラス	day1,2	
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	

1クール  
休薬期間

ベクティビックス(パニツムマブ): ベクティビックス点滴静注 100mg, 400mg  
 レボホリナート(レボホリナート): レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg「ヤクルト」  
 フルオロウラシル(フルオロウラシル): フルオロウラシル注 250mg, 1000mg「トーフ」  
 オキサリプラチン(オキサリプラチン): オキサリプラチン点滴静注液 50mg, 100mg「ホスピーラ」

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス	●													
レボホリナート	●	●												
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
フルオロウラシル<ポーラス>	●	●												
エルプラット	●													

		本管	
第1日目	全開	ルートキープ用 生食 100mL 使用可 グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL デキサート注射液6.6mg 1V	
	1時間	ベクティビックス 6mg/kg 生理食塩液 100mL	
	5分	ルートキープ用生理食塩液 100mL	
	2時間	レボホリナート 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL	オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL (側管)
	全開	フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
第2日目	22時間	フルオロウラシル 600mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 500mL	
	2時間	レボホリナート 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL	
	全開	フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
	22時間	フルオロウラシル 600mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 500mL	

H25.4.16 作成  
 H27.6.5 改訂  
 H27.9.29 改訂