

外科41 mFOLFOX6+ベクティビックス

☆適応疾患名:結腸直腸がん

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール	
			1week	2week
ベクティビックス (P-mab)	6mg/kg	点滴静注	day1	
レボホリナート (-LV)	200mg/m ²	点滴静注	day1	
フルオロウラシル (5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m ²	静注(全開)	day1	
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m ²	点滴静注	day1	

← 1クール →

← 休薬期間 →

ベクティビックス(パニツムマブ):ベクティビックス点滴静注 100mg,400mg
 レボホリナート(レボホリナート):レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg「ヤクルト」
 フルオロウラシル(フルオロウラシル):フルオロウラシル注 250mg,1000mg「トーワ」
 オキサリプラチン(オキサリプラチン):オキサリプラチン点滴静注液 50mg, 100mg「ホスピール」

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス	●													
レボホリナート	●													
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
フルオロウラシル<全開>	●													
オキサリプラチン	●													

		CVポートより	
		ルートキープ用 生食 100mL 使用可	
第1日目	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V	
	1時間	ベクティビックス 6mg/kg 生理食塩液 100mL	
	5分	ルートキープ用生理食塩液 100mL	
	2時間	レボホリナート 200mg/m ² 5%ブドウ糖注 250mL	オキサリプラチン85mg/m ² 5%ブドウ糖注 250mL (側管)
	全開	フルオロウラシル 400mg/m ² 生理食塩液 50mL	
第2日目	46時間	フルオロウラシル 2400mg/m ² (生食で希釈) インフューザーポンプ使用 (2mL/h)	